

Taxon Grossularia uva crispa ‘Triumphant’

Název taxonu	Grossularia uva crispa ‘Triumphant’
Vědecký název taxonu	Grossularia uva crispa
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Mill.
Odrůda	‘Triumphant’
Český název	srstka obecná
Synonyma (zahradnický pou..	‘Gelbe Triumphbeere’
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. neznámý

Zařazení

Pěstitelská skupina Bobulovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř: polovzpřímený, nepoléhavý
Pupeny	vejčité, velké, špičaté, 4-6 mm dlouhé a 2 mm tlusté, světle hnědé barvy
Listy	velké, středně zelené, hladké, lesklé
Květy	obojetné, pětičetné, kalichovit tvar, nápadně větší, korunní plátky bílé, vysoké, kuželovitého tvaru
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velké až velké (5,8 g), elipsovité až protáhlé, lysé s výraznou žilnatinou, zlatožluté, velmi dobré
Možnost záměny taxonu (+..	Elipsoidní tvar, střední velikost a zlatožlutá barva plodů v konzumní zralosti, řidší, menší, polokulovitý habitus korun, velký list s úzkými zářezy a překrývajícími se laloky.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná až středně raná, od 6. do 18. dubna

Doba zrání

Doba zrání - poznámka středně raná, polovina července

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	mrazy snáší dobře
Faktor půdy	nejlépe lehčí půdy s dostatečnou zásobou organických látek, v těžších půdách trpí okrajovým zasycháním listů

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	vhodnější je pravidelný prosvětlovací řez
Podnož	meruzalka zlatá

Užitné vlastnosti

Použití	konzervace, stolní ovoce, kompotování, džemy
Choroby a škůdci	vysoce odolná proti padlí, středně odolná proti antraknóze
Růstové i jiné druhově spec..	středně vzrůstná odrůda
Plodnost	brzká, velká, pravidelná (2,3-3,5 kg/strom, 4,5-5,0 kg/keř)

Množení

Množení	Bylinné řízky, Dřevité řízky a Roubování - Kopulace
---------	---

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba drobného ovoce\)](#)

Ostatní

Poznámka	Výkonná odrůda využívaná ve velkovýrobě k produkci plodů pro konzervářenské zpracování, u drobných pěstitelů jako stolní ovoce i ke kompotování a přípravě džemů. Nejlepší plody jsou dosahovány v lehčích humózních půdách.
----------	--

Grafické přílohy

