

Taxon Prunus cerasifera

Název taxonu	Prunus cerasifera
Vědecký název taxonu	Prunus cerasifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Ehrh.
Odrůda	‘Nigra’
Český název	slivoň třešňová, myrobalán
Synonyma (zahradnický pou..	Prunus myrobalana Loisel.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
------------------------	--

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	keř nebo strom
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	statný keř nebo strom 4-8 m vysoký, s korunou hustou, pravidelnou a vejčitou
Výhony	někdy trnité, mladé větvičky lysé nebo olysalé
Pupeny	tmavé, střídavé
Listy	střídavé, vejčité až elipčité, 3 - 6 cm dlouhé, přišpičatělé, jemně tupě pilovité, k bázi široce klínovité, lysé, jen podél střední žilky chlupaté
Květy	oboupohlavné, většinou jednotlivé, bílé, 1,5 - 2,5 cm v průměru, na lysých, 5 - 15 mm dlouhých stopkách, rozkvétají obvykle s listy
Plody	široce vejčité až kulaté, červené, nebo žluté 2 - 2,5 cm v průměru, slabě ojínné; plod často opadává i se stopkou
Semena	pecka slabě smáčklá a srostlá s dužinou
Kůra a borka	šedohnědá, brázditá ve stáří, s četnými lenticelami
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus spinosa (má menší listy než popisovaný druh, plod modrý)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
----------------------	-------

Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	rozkvétá obvykle s listy

Nároky na stanoviště

Faktor světla	světломilná dřevina
Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	otuzilý druh, oblasti I-IV
Faktor vody	nenáročný
Faktor půdy	nejlépe se daří v nepřiliš těžké půdě s větším obsahem vápna
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin
Použití	ideální do menších objektů, do krajiny, na okraje skupin
Růstové i jiné druhově spec..	krásné květy, chutné plody, husté zavětení

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělků, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy a kultivary se množí roubováním nebo očkováním
Odrůdy	‘Hessei’ - pomalu rostoucí keř, listy nepravidelně vykrajované, deformované, tmavě červené s bílými nebo žlutavými fleky; ‘Nigra’ - má letorosty i listy tmavě hnědočervené, lesklé a květy lilákově růžové, až 2,5 cm široké; ‘Pendula’ - větve převislé; ‘Purpurea’ - listy tmavočervené, žlutě a růžově strakaté

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Slovácká - Valtická / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)