

Taxon *Microsorium punctatum*

Název taxonu	<i>Microsorium punctatum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Microsorium punctatum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(L.) Copel. (1929)
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Pleopeltis irioides</i> (Poir.) T. Moore; <i>Acrostichum punctatum</i> L., <i>Polypodium irioides</i> Poir.,
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Microsorium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše, Indo-súdánská oblast, Konžsko-guinejská oblast, Usambarská oblast, Indická oblast, Indočínská oblast, Malesijská oblast, Malesijská oblast, Novokaledonská oblast, Polynézká oblast, Australská květenná říše a oblast australského severovýchodu
Biogeografické regiony - po..	subsaharská Afrika, jižní a jihovýchodní Asie, východní Austrálie, Nová Guinea, ostrovy Pacifiku

Zařazení

Fytocenologický původ	v nejrůznějších typech lesa jako epifyt na kmenech a větvích, petrofyt na balvanech; roste rovněž terestricky
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	kapradina stěsnaného trsovitého vzhledu
Kořen	silné oddenky, kryté oválnými černými šupinami
Listy	pevně přisedlé, široce lineární (50-100 x 4-6 cm), postupně se zužující do obou konců, pevné, kožovité, celokrajné, žlutozelené; okraj zvlněný, síťnatá žilnatina sotva patrná; výtrusnicové kupky (sori) velmi malé a nepravidelně roztroušené po celé horní polovině trofosporofylů, výtrusnicové kupky se nenacházejí v těsné blízkosti středního žebra (costa)
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Microsorium musifolium</i> - líc listu má rastr žilnatiny v podobě "krokodýlí kůže", výtrusnicové kupky na rubu listu se nacházejí v těsné blízkosti středního žebra

Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	lehký polostín
Faktor tepla	teplý skleník; teploty v zimě minimálně 12-15 °C
Faktor vody	vysoká půdní a vzdušná vlhkost.
Faktor půdy	substrát velmi vzdušný s příměsí borky, polystyrenu, bukového listí a dřevěného uhlí

Užitné vlastnosti

Použití	Málo produkčně pěstovaný taxon, sbírkový charakter. Zimní zahrady, okenní skleníky, vitríny, otevřený interiér dočasně.
---------	---

Množení

Množení	Vegetativní, Kořenové řízky a Množení oddělky
Množení - poznámka	pouze vegetativně, dělením oddenku, aby se zachovaly morfologické zvláštnosti v nezměněné podobě
Odrůdy	‘Grandiceps’ - špička listu laločnatá, hřebenitá, celkově povislá

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (teplý skleník)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://www.tropicos.org/Name/26601760?tab=references http://www.tropicos.org/Name/26601760?tab=chromosomecounts
--------	--

Grafické přílohy

