

Taxon Vitis vinifera Rhea

Název taxonu	Vitis vinifera Rhea
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Rhea’ (Rh)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Jupiter
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Damascenka růžová (Ceaus roz)’ x ‘Chibrid bezsemen V-6’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	velké, pěti i vícelaločnaté s výraznými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený s průsvitem; povrch listu je mírně vrásčitý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, středně hustý až řidší hrozen; bobule je velmi velká, vejcovitá, růzovofialové barvy
Semena	nejčastěji malá, zelená, rudimentální nebo dutá (stenospermokartie)
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	suché písčité půdy jsou nevhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, citlivější k plísni šedé
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 6-9 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízky i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, v ústech rozplývavá, neutrální chuť

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	V / ZF - V - vinice (řádek 131)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

