

Taxon *Lactuca sativa* var. *capitata*

Název taxonu	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i>
Vědecký název taxonu	<i>Lactuca sativa</i> var. <i>capitata</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L., L.
Český název	salát hlávkový
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>capitata</i>
Nadřazená kategorie	Lactuca

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po... pravděpodobně z planě rostoucí lociky kompasové *Lactuca seriola*, Egypt, Persie, Řecko

Zařazení

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Listová a stonková zelenina
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro hlávku tvořenou listy

Popisné a identifikační znaky

Habitus	hlávka tvořená zavínutými listy
Kořen	plytká kořenová soustava, křídlový kořen krátký
Listy	první pravé listy jsou krátce řapíkaté, vejčitého tvaru, další listy vyrůstají ze zkráceného stonku, jsou široce vejčité až okrouhlé, s výrazným středním žebrem, bezřapíkaté, hladké i bublinaté, barvy zelené, žlutozelené, načervenalé, ale i hnědočervené, listy se zavínají v hlávku
Květenství	za dlouhého dne prorůstá hlávkou 0,8 - 1 m dlouhá dužnatá lodyha, nesoucí vrcholičnaté květenství, kvetení podporuje i vysoká teplota a sucho
Květy	žluté květy sestavené v úbor
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	ochmýřená nažka
Semena	podle odrůdy stříbřité nebo hnědé barvy, HTS 0,8 - 1,2 g
Vytrvalost	jednoleté

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka kvete za dlouhého dne

Doba zrání

Začátek doby zrání	Květen
Konec doby zrání	Říjen
Doba zrání - poznámka	dle termínu výsadby

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročný, rozte již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí
Faktor půdy	středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

Užitné vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	okrajová nekróza listů, zasolení (salinita) půdy, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), bakteriální vadnutí salátu (bakterie <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>), podehnívání salátu (různé houby např. <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> , <i>Botryotinia fuckeliana</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , plíseň salátu (<i>Bremia lactucae</i>), mšice (<i>Aphidoidea</i>), drátovec (<i>Elaterridae</i>)
Doporučený spon pro výsad..	jarní 0,2 - 0,25 x 0,25 - 0,3 m, letní 0,3 x 0,3 - 0,35 m v závislosti na odrůdě

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	málo z přímého výsevu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)