

Taxon Ammi visnaga

Název taxonu	Ammi visnaga
Vědecký název taxonu	Ammi visnaga
Jména autorů, kteří taxon p...	Lamarck, Jean Baptiste Antoine Pierre...
Český název	morač zákrovnatý; pakmín
Synonyma (zahradnicky pou..	Visnaga daucoides Gaertn., Apium visnaga Crant, Carum visnaga Koso-Pol., Daucus visnaga L.
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Ammi

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	původní druh pochází z jižní Evropy z malé Asie, Kavkaz, severní Afrika

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Pěstitelská skupina - pozná..	původní výskyt je v travnatých porostech na zásaditých půdách a na suchých travnatých svazích v nadmořské výšce do 500 m.n.m.
Životní forma	Terofyt
Životní forma - poznámka	letnička z přímého výsevu

Popisné a identifikační znaky

Habitus	pravá letnička, je-li pěstovaná, dosahuje výšky kolem 80–120 cm a je charakteristická velmi lehkou vzdušnou stavbou; k tomu přispívají jak dvakrát až třikrát peřenosečné listy s jemnými niťovitými úkrojky, okolíky jsou mnohem mohutnější a větší než u druhu Ammi majus, složené z mnoha malých okolíčků bílé barvy. Okolíky bílé barvy jsou nesený na dlouhých stopkách a dorůstají průměru 10–15 cm. Plod je podobný kmínu.
Kořen	kulovitý kořen
Listy	peřenosečné, úzké úkrojky
Květenství	mohutný okolík
Květy	květy bílé
Plody	plodem je dvounažka, podobná kmínu

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Použití	pestré záhony z přímého výsevu, řez (i komerčně na burzách), sušení, v léčitelství (plod)
---------	---