

Taxon Acorus gramineus

Název taxonu	Acorus gramineus
Vědecký název taxonu	Acorus gramineus
Jména autorů, kteří taxon p...	Sol. ex Aiton (1789)
Český název	puškvorec trávovitý
Synonyma (zahradnický pou..	Acorus pusillus Siebold; Acorus humilis Salisb.; Acorus xiangyeus Z.Y. Zhu; Acorus brevispathus K.M. Liu
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Acorus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše, Čínsko-japonská oblast, Paleotropická květenná říše, Indická oblast a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	Indie, Thajsko, Čína, Japonsko

Zařazení

Fytocenologický původ	rostlina okrajů vodních toků a ploch
Pěstitelská skupina	Trvalka stálezelená, Interiérová rostlina okrasná listem a Léčivá rostlina
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trávovitá bahenní rostlina výšky 15 – 20 cm, zelené kultivary až 40 cm
Kořen	krátký plazivý oddenek
Listy	strnule vzpřímené trávovité listy (50 x 0,8 cm), měkké, plošně uspořádané do vějíře
Květenství	u starších rostlin se objevují palice bez toulce
Květy	žluté květy do 0,4 cm podepřené listeny; v našich podmínkách většinou nekvete
Vytrvalost	podmínkách exteriéru jednoletý

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	světlé, ne na plné slunce
Faktor tepla	chladné a pokud možno vzdušné stanoviště; optimální teplota 15-18°C; přes léto lze pěstovat venku, v zimě vyžaduje chlad 10-12(-15) °C, snese poklesy až k 0 °C
Faktor vody	vydatná zálivka, kořenové baly by neměly přeschnout, voda v misce neškodí.
Faktor půdy	substrát písčitý s přidavkem rašeliny; pH 5,5 – 6,5

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití	jako interiérová hrnková květina na dobře osvětleném a chladném místě; často se používá v akvaristice a teraristice
Choroby a škůdci	svilušky a třásněnky na teplém a suchém stanovišti; případně poruchy růstu v suchém a teplém prostředí, zasychají špičky listů
Růstové i jiné druhově spec..	léčivá rostlina

Množení

Množení	Vegetativní, Dělení trsů, Množení oddělky a Ablaktace
Množení - poznámka	oddělky zakořeňují při teplotě kolem 18°C
Odrůdy	var. pusillus (Siebold) Engl. - drobnější; 'Variegatus'; 'Argenteovariegatus' - bílé panašování listů (podélné pruhy); 'Aureovariegatus' - žluté panašování listů (podélné pruhy)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/2100016>
- <http://www.iucnredlist.org/details/169076/0>
- <http://tropicos.org/Name/2100016?tab=references>
- <http://www.biolib.cz/cz/taxon/id194637/>

Grafické přílohy

