

# Taxon Rheum rhabarbarum

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Název taxonu                   | Rheum rhabarbarum                     |
| Vědecký název taxonu           | Rheum rhabarbarum                     |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">L.</a>                    |
| Odrůda                         | ‘Glaskins Perpetual’                  |
| Český název                    | reveň vlnitá                          |
| Synonyma (zahradnický pou..    | Rheum undulatum L.                    |
| Autor                          | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                  |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Rheum</a>                 |

## Biogeografické regiony

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Biogeografické regiony - po.. | severozápadní Čína, Mongolsko, jihovýchodní Sibiř |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|

## Zařazení

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Pěstitelská skupina | Trvalka zatahující a Listová a stonková zelenina |
|---------------------|--------------------------------------------------|

## Popisné a identifikační znaky

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kořen      | tlustý, dužnatý, mohutný oddenek                                                                                                         |
| Listy      | listová čepel vejčitá, na bázi kornoutovitě svinutá, celokrajná, mírně zvlněná, řapíky slabě rýhované , dužnaté od zelené po tmavě rudou |
| Květenství | lodyha vysoká 2 m, větvená, dutá, lodyžní listy jsou mnohem menší, květenství je mohutná lata                                            |
| Květy      | žlutozelené kvítky                                                                                                                       |
| Plody      | trojkřídlé nažky                                                                                                                         |
| Semena     | HTS 12 - 15 g                                                                                                                            |
| Vytřvalost | vytrvalá                                                                                                                                 |

## Nároky na stanoviště

|                        |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Faktor světla - slunce | ✓                                                                                             |
| Faktor tepla           | nenáročná, listy snesou mrazy do -4 °C                                                        |
| Faktor vody            | podzemní voda 1 - 1,5 m pod úrovní půdy, náročná na vodu                                      |
| Faktor půdy            | středně těžké, hluboké, záhřevné, dobře vododržné, pH 5,6 - 7,2, nesnáší zamokřené stanoviště |

## Užitné vlastnosti

|         |          |
|---------|----------|
| Použití | zelenina |
|---------|----------|

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Choroby a škůdci            | skvrnitost listů reveně (spůsobuje houba <i>Ascochyta rhei</i> a <i>Ramularia rhei</i> ), hniloba kořenů reveně (houba <i>Phytophthora cactorum</i> ) |
| Doporučený spon pro výsad.. | pěsrování sadby 0,25 - 0,3 x 0,25 - 0,3 m, trvalé stanoviště 1,5 - 2 x 0,35 - 0,6 m, nebo 1 x 1 m                                                     |

## Množení

---

Množení      Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbližší státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(genofond\)](#)