

Taxon *Cyperus glaber*

Název taxonu	Cyperus glaber
Vědecký název taxonu	Cyperus glaber
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	šáchorek lysýc
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cyperus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	jižní Evropa, přední Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Letnička pravá a Letnička nepravá
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	rychle rostoucí, mírně odnožující svěže zelený trs, v době květu vysoký 60 - 70 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, pevná, trojúhelníková na průřezu, 60 - 70 cm dlouhá ukončena květenstvím
Listy	svěže zelené, 20 - 40 cm dlouhé a 1,5 cm široké s výrazným žlábkem uprostřed
Květenství	kružel tvořen klásky podepřenými 6 – 8 listeny, podstatně delšími než květenství.
Květy	svěže zelený lichoklas
Vytrvalost	v našich klimatických podmínkách nepřezimuje

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje plné slunce na otevřeném stanovišti
Faktor tepla	teplomilný taxon; u nás nepřezimuje

Faktor vody	svěží až vlhká zahradní půda; suchou půdu toleruje
Faktor půdy	hlinitopíščitá i humózní půda

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití	letničkové záhony, přírodě podobné vegetační prvky, řez v čerstvém stavu, sušení.
Růstové i jiné druhové spec..	v pěstování nenáročná, málo známá letnička
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
Množení - poznámka	předpěstování ve skleníku - výsev v dubnu, výsadba ve druhé polovině května; možnost přímého výsevu v dubnu

Grafické přílohy

