

Taxon Vitis vinifera Pesecka leanka

Název taxonu	Vitis vinifera Pesecka leanka
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Pesecká Leánka’ (PL)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Feteasca regala, Kyraly Leanyka, Fetjaska korolevskaja
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	patmě rumunský, vznikla křížením odrůd ‘Dívčí hrozen’ x ‘Grasa de Cotnari’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má střední až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, pětilaločné s výraznými horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, šířeji otevřený; povrch listu je tmavě zelený, velmi slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý až středně velký kuželovitě-válcovitý hrozen, hustší, kompaktní; bobule středně velká, žlutozelená; na vrcholu bobule je černá tečka po blizně
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	‘Dívčí hrozen - Leánka’ (má široce otevřený bazální výkroj)

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Říjen
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost vyšší
Faktor vody	suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	humóznější, písčitohlinité a hlinité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	většinou SO 4, CR 2 i Kober 125 AA; na sušší stanoviště Kober 5 BB

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízký i mikropropagací
Popis vína	víno je ovocně kořenité vůně i chuti, s vyšší kyselinkou
Doporučená technologie vína	jakostní i přívlastková bílá vína, kupáže

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

Grafické přílohy

