

Taxon Chaenomeles x superba

Název taxonu	Chaenomeles x superba
Vědecký název taxonu	Chaenomeles x superba
Jména autorů, kteří taxon p...	(Frahm) Rehder
Český název	kdoulovec nádherný
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Chaenomeles

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. (C. japonica x speciosa)

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keř 120-150 cm vysoké, hustě a vzpřímeně větvené
Výhony	má zkrácené, trnitě větvené výhony, letorosty drsně plstnaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy intermediární, ale nejčastěji podobné na C. japonica, jen užší a ostřeji pilovité
Květy	květy středně velké, bílé, růžové, oranžové nebo (tmavě) červené
Plody	aromatická tvrdá malvice jablkovitého tvaru
Možnost záměny taxonu (+..	C. spesiosa - podobný hlavně habituálně, ale superba má letorosty v mládí chlupaté, listy podobné C. japonica, ale užší a ostřeji pilovité

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Březen
Konec doby kvetení	Duben

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	jen ne extrém
Faktor půdy	jen ne extrém, jinak nenáročný

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	III-IV - květ
Použití	pro větší i menší zahrady i parkové úpravy a sídlištní zeleň, a to jednotlivě nebo ve skupinách, lze jej též použít do volně rostoucích živých plotů

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Kořenové řízky a Roubování
Množení - poznámka	roubování je možné na vlastní kořeny