

Taxon Acer tataricum

Název taxonu	Acer tataricum
Vědecký název taxonu	Acer tataricum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	javor tatarský
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Acer

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast
------------------------	--------------------------------

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	menší stromek, nebo jen keř, dorůstající do 10 m výšky, keř do 7 m, koruna široce vejčitá, v obrysu často nepravidelná, hustě větvená
Výhony	letorosty šedohnědé, nebo hnědočervené, mohou být pýřité, později olysávají, starší větvičky šedohnědé
Pupeny	drobné do 0,4 mm, tupě zakončené, mohou být lehce pýřité, nebo lysé, kryté několika šupinami
Listy	papírovité, poměrně tenké, v obrysu vejčité, 6-10 cm dlouhé a 4-7 cm široké, bez laloků nebo třílaločné, bazální laloky do 1/2 čepele od báze, vejčité, báze mělce srdčitá nebo uťatá až oblá, nepravidelně 2x ostře pilovité, líc světle až sytě zelený, lysý, rub téměř stejné barvy, na žilnatině pýřité, řapík 3-5 cm dlouhý, načervenalý
Květenství	vzpřímené laty
Květy	žlutobá barvu
Plody	3-4 cm dlouhé nažky, křídla uspořádaná v ostrém úhlu, nebo téměř paralelně, zbarvují se do červena, oříšky mohou být lehce pýřité, nebo lysé, vždy pokryté žilkami
Kůra a borka	v mládí hladká, šedohnědá až šedočerná, ve stáří poněkud rozpraskaná a téměř černá
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka v druhé polovině května po vyrašení listů

Nároky na stanoviště

Faktor světla	upřednostňuje slunné stanoviště, až střídání světla a stínu
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, oblasti I-II, teplomilný, upřednostňuje teplé a málo mrazové oblasti, snáší extrémní horka
Faktor vody	vyhledává středně suché až čerstvé, příležitostně navlhle půdy, dobře snáší vzdušné a vysychavé půdy, odolný vůči suchu
Faktor půdy	půdy bohaté na živiny, lehce kyselé až alkalické, písčité jílovité až jílovité, propustné
Faktor půdy - poznámka	na půdách těžkých, vlhkých a bohatých na živiny dochází ke škodám způsobeným mrazy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	nejčastěji žlutá, oranžová až do purpurové, barví v druhé polovině září
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin) a VPz - Volné plochy záhonového charakteru
Použití	poměrně hojně používaný keř, do menších objektů, jako keřová skupina ve větších objektech, na okraje porostů, do městského prostředí (tolerance k výkyvům teplot)
Růstové i jiné druhově spec..	tvarovatelná dřevina, podzimní zbarvení

Množení

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Dřevité řízky, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka	očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy	asi 20: 'Crispatum' - okraje listu pokroucené, 'Nanum' - hustě větvený keř zakrsle a pomalu rostoucí, 'Rubrum' - listy krvavě červené při opadu, 'Variegatum' - listy panašované

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Arizona / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - Podzámecká louka / Zámecký park v Lednici](#)
- [Park - nespecifikováno / Zámecký park v Lednici](#)