

Taxon Cotoneaster bullatus

Název taxonu	Cotoneaster bullatus
Vědecký název taxonu	Cotoneaster bullatus
Jména autorů, kteří taxon p...	Bois
Český název	skalník puchýřnatý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cotoneaster

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	západní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý rozkladitý keř až 4 m vysoký
Výhony	letorosty šedočerné či kaštanové a hustě chlupaté
Pupeny	střídavé
Listy	řapíky 1-6 mm, čepel podlouhle vejčitá až eliptická nebo kopinatě podlouhlá, 30-150 x 20-80 mm velká, na rubu většinou chlupatá, svrchu výrazně svraskalá a puchýřnatá
Květenství	chocholíky 5-31květé
Květy	květy mají 7-8 mm v průměru, koruna narůžovělá, tyčinek 20-22
Plody	plody červené, 6-8 mm velké

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nejotůžilejší z C.
Faktor vody	snese suché půdy
Faktor půdy	nenáročný
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezóna
Použití	vhodný jako solitera či do skupin keřů
Choroby a škůdci	velmi citlivý na bakteriospálu

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
---------	---