

Taxon *Leucojum aestivum*

Název taxonu	Leucojum aestivum
Vědecký název taxonu	Leucojum aestivum
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	bledule letní
Synonyma (zahradnický pou..	Nivaria aestivalis Moench, N. monadelphica Medik
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Leucojum

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	Vyskytuje se od Velké Británie, přes západní, střední a východní Evropu a Balkánské země na Ukrajinu, Turecko, Írán, až po ruský Kavkaz
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Cibulnatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru
Zařazení podle původu, nár...	Cibule se vysazují v srpnu a v září do hloubky 10 cm na polostinné místo do vlhké humózní půdy. Mají-li dostatek vláhy, rostou dobře i na slunném, ne však na příliš teplém výsušném stanovišti. Cibule mohou zůstat na stejném místě mnoho let, chceme-li je přesadit, je vhodné v průběhu zatahování listů vyjmout cibule z půdy a ihned je vysadit na nové místo. Při delším skladování je vhodné uložit cibule do mírně vlhké rašeliny, protože mají jen tenkou slupku a snadno vysychají.

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Vzpřímené listy a květní stonky dosahují výšky až 50 cm. Z cibule vyrůstá 4-7 listů a zpravidla jeden dutý, zploštělý, trojkřídlý, jemně zubatý stonek nesoucí 3-6 květů uspořádaných v okolíku.
Květy	Květy mají bílou barvu se zelenou skvrnou na konci okvětních plátků. Vykvétá v dubnu až květnu. V obchodě je nabízena odrůda 'Gravetye Giant' která je robustnější, s většími květy, kterých bývá na stonku až 8. <i>L. aestivum</i> subsp. <i>aestivum</i> je domácí v širokém areálu od Velké Británie, přes západní, střední a východní Evropu a Balkánské země na Ukrajinu, Turecko, Írán, až po ruský

Kavkaz. *Leucojum aestivum* subsp. *pulchellum* (Salisb.) Briq. (syn. *L. hernandezii* Cambess., *L. pulchellum* Salisb.) roste jižněji ve Francii, Španělsku a Itálii a má menší květy, hladký okraj stonku a vykvétá o něco později.

Plody	Tobolka.
Semena	Drobná a černá.
Vytrvalost	Na vhodných stanovištích dobře vytrvalá.
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	Doba kvetení je závislá na aktuálním průběhu počasí a průměrných teplot vzduchu, a proto doba rašení a kvetení může být variabilní.

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Užitné vlastnosti

Použití	Nejvhodnějším místem pro bledule je podrost listnatých stromů a okolí vodních nádrží, kde časem vytvoří i rozsáhlé porosty. Můžeme se však uplatnit i v trvalkových záhonech a na okrajích trávníků.
Choroby a škůdci	V našich podmínkách netrpí chorobami ani škůdci.
Růstové i jiné druhově spec..	Z drobné vejčité cibule bílé barvy, kryté slabou tmavou slupkou, vyrůstají podlouhlé žlábkovitě prohnuté listy a květní stvol nesoucí 1-7 květů zvonkovitého tvaru visících dolů, které jsou před rozkvetem chráněny blanitým listenem. Květy jsou složeny ze šesti plátků bílé barvy se zelenavou skvrnou nad špičkou. Plodem je kulovitá tobolka. Požití částí rostliny, především cibulek, způsobuje otravy projevující se sliněním, zvracením, průjmem, poruchami vědomí a celkovou slabostí.

Množení

Množení - poznámka	Rostliny se množí dceřinými cibulkami. Možný je také výsev semen. Na vhodných stanovištích se množí i samovýsevem. Semenáčky vykvétají za 2-3 roky.
--------------------	---

Celky sbírek

- [Labyrint zahrad / Unspecified \(Labyrint- stinná zahrada\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2023

Výsev/výsadba na stanoviš... Labyrint- stinná zahrada: X/2023

Dodavatel Labyrint- stinná zahrada: Trvalky Semanín

Grafické přílohy

