

Taxon Centaurea macrocephala

Název taxonu	Centaurea macrocephala
Vědecký název taxonu	Centaurea macrocephala
Jména autorů, kteří taxon p...	Muss. Puschk. ex Willd
Český název	chrpa velkohlavá
Synonyma (zahradnický pou..	Grossheimia macrocephala (Muss. Puschk. ex Willd.) Sosn. & Takht.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Centaurea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Kavkaz, Turecko

Zařazení

Fytocenologický původ	subalpínské louky 2000-2300 m.n.m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	statné 80 - 150 cm vysoké, vzpřímené trsy
Kořen	křivolitý
Výhony	lodyhy vzpřímené, silné, nevětvené nebo zřídka rozvětvené 80 - 120 (150) cm vysoké, hustě stříbřitě vlnaté
Listy	přizemní široce kopinaté, pozvolna v řapík zúžené, 40 x 15 (20) cm velké naředlé s výrazným bělavým žebrem, lodyžní přisedlé, sbíhavé, celokrajné, podlouhlé, hustě do spirály na lodyze postavené, také šedavé, chlupaté
Květenství	úbor 5 - 10 cm velký, vejčitého tvaru; zákrov kulatý, listeny zákrovu hnědé, suchomázdřité, nafouklé a dovnitř zahnuté, na okraji dlouze ostře zubaté.
Květy	koruny květů žluté, s tenkými niťovitými jazykovitými úkrojky, hustě nahloučené do kompaktního "vajíčka"
Plody	nažka
Vytrvalost	vytrvalá
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	v květu velmi atraktivní
Remontování - poznámka	ojediněle

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	přiměřeně vlhká půda, velmi dobře toleruje sucho
Faktor půdy	živné, hluboké, humózní i hlinité, hlinitopísčité, propustné
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné ph

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	zajímavá solitéra nebo použití v menších skupinách
Použití	řez květů - obchodování na burzách; také sešení - zajímavé zákrovy květenství před rozvojem jazykovitých květů; při sušení s rozkvetlými jazykovitými květy dochází k jejich hnědnutí
Choroby a škůdci	blyskáčci
Doporučený spon pro výsad..	3 ks /m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
---------	-----------------------------------

Ostatní

Odkazy	- Sutton, J. Cornflowers. In The Plantsman (New Series), The London: Royal Horticultural Society, 2010. 9(9), 176-179. ISSN 0352-4186. - Griebel, Norbert. 2023. Locker-flockig in den naturgarten. Gartenpraxis. 49(12), 6-15. ISSN 0341-2105.
--------	--

Grafické přílohy

