

Taxon Berberis x media 'Parkjuweel'

Název taxonu	Berberis x media 'Parkjuweel'
Vědecký název taxonu	Berberis x media
Jména autorů, kteří taxon p...	Groot.
Odrůda	'Parkjuweel'
Český název	dříšťál prostřední
Autor	Jana Mokříčková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Berberidaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	původ kultivaru: kříženec Berberis hybrido-gagnepainii 'Chenault' a Berberis thunbergii, Holandsko 1956
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 1,5 - 2 m, vzrůst řídce kulovitý
Výhony	letorosty hranaté a s červenohnědé, s 3dílnými trny, 20 - 30 mm
Pupeny	střídavé
Listy	listy podlouhle vejčité, 1.5–3 cm dlouhé, po stranách se 2–4 malými zoubky, silně lesklé, tmavozelené, rub zelený
Květenství	v okolíčnatých květenstvích
Květy	stopky květů 5–10 mm, sepaly ve 2 kruzích, vnější červenavé a vejčitě eliptické, 4–4.5 × 2.5–3 mm velké, vnitřní široce eliptické, 5–6 × 3.3–3.7 mm velké, petaly podlouhle obvejčité, 5.5–6 × 3–4 mm
Plody	plody červené, později černající, elipsoidní nebo kulovité a 7–10 × 4 mm velké
Semena	1 - 2 na plod
Kůra a borka	červenohnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 4 (do - 34°C)
Faktor vody	nemají rádi přemokřené půdy, ale vyžadují mírně vlhké půdy
Faktor půdy	neutrální

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez dle použití

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezona, podzim - vybarvuje do zářivě červené barvy
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, živé ploty
Choroby a škůdci	Přeslenatka obecná, Bakteriální skvrnitost listů a výhonů, Pilatěnka dříšťálová

Množení

Množení	Přímý výsev, Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Vrcholové řízky, Osní řízky a Bazální řízky
Množení - poznámka	Generativní množení je možné, ale potomstvo je variabilní, v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary druhu Berberis x media množení řízkováním

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Poznámka	matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 30 cm nad zemí)