

Taxon Cotoneaster divaricatus

Název taxonu	Cotoneaster divaricatus
Vědecký název taxonu	Cotoneaster divaricatus
Jména autorů, kteří taxon p...	Rehder & E. H. Wilson
Český název	skalník rozkladitý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cotoneaster

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý, řídce rozkladitý keř 1-2 m vysoký
Výhony	letorosty tmavě červenohnědé nebo šedohnědé či hnědavě fialové, zprvu hřebíkatě chlupaté
Pupeny	střídavé, dvouřadé
Listy	listy eliptické až vejčitě eliptické, 10-25 mm dlouhé, na líci tmavozelené, lesklé, na rubu slabě chlupaté, na podzim šarlatově červené
Květy	květy nařůžovělé, zvonkovité, po2-4
Plody	plody tmavě červené, elipsoidní, asi 8 mm dlouhé, většinou se 2 pečičkami

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor tepla	oblast I-II (III)
Faktor vody	snese suché půdy
Faktor půdy	nenáročný
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	vegetační sezóna
Použití	často vysazován do skupin i živých plotů

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Dřevité řízky
---------	---