

Taxon Primula vulgaris

Název taxonu	Primula vulgaris
Vědecký název taxonu	Primula vulgaris
Jména autorů, kteří taxon p...	Huds.
Český název	prvosenka bezlodyžná (1950)
Synonyma (zahradnický pou..	Primula acaulis (L.) Hill.; Primula veris L. var. acaulis L.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Primula

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa: západní, střední a jihovýchodní; Kavkaz; Malá Asie, Sýrie, Alžírsko; v ČR zplaňuje z kultury skalniček, původní je ve střední až západní části SR

Zařazení

Fytocenologický původ	vlhké, ale propustné, úživné půdy listnatých lesů a luk
Pěstitelská skupina	Trvalka polostálezelená a Interiérová rostlina okrasná květem
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytrvalá bylina s listy v přzemní růžici, výška 10-20 cm
Listy	uspořádané v růžici; (dlouze) obvejčité až obkopinaté, 20-25 x 8-12 cm, měkké, svěže zelené, výrazně žilnaté; okraj listu zubatý až vroubkovaný,
Květy	jednotlivě až 25 řepcovitých květů; dlouhé (až 10 cm) a chlupaté stopky; kalich trubkovitý, hranatý, až 1,5 cm dlouhý, dlouhé, až do poloviny délky střižené cípy; koruna bílá, žlutá, oranžová, růžová, červená, modrá, případně dvojbarevné, v průměru až 3,5 cm, jednoduché i plné kultivary
Vytrvalost	vytrvalá
Dlouhověkost	původní druh dlouhověký, odrůdy středněvěké

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Leden
----------------------	-------

Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	ve venkovních podmínkách kvete III - IV; pro pěstování v interiéru nabízena v předjaří (I - IV)

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světlé až polostinné stanoviště, ne úpal
Faktor tepla	studený skleník či interiér; v době kvetení 10-15 °C, při nižších teplotách kvetou déle
Faktor vody	rovnoměrná zálivka bez převlhčení substrátu; při vyšších teplotách vyšší vzdušná vlhkost
Faktor půdy	humózní s přídavkem zahradní zeminy; pH 6,0 - 6,8

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden až prosinec
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin a OPD - Okraj porostu dřevin
Použití - pro trvalky - pozná..	světlé podrosty listnatých stromů nebo louky
Použití	floristicky a tržně velmi významná krátkodobá hrnkovka okrasná květem; po odkvětu ji lze vysadit do zahrady.
Choroby a škůdci	listové mšice; houby rodu Ramularia způsobují skvrny na listech
Doporučený spon pro výsad..	16 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní a Předpěstování sadby
Odrůdy	Velmi bohatá odrůdová skladba: Odrůdy se liší: a) dobou květu: 1) velmi rané - rané (např. skupina Primavera, Nevada F1, Arizona F1), 2) středně rané (např. Herkules F1, Dakota F1, Lucia F1, 'Girl's Delight F1', 'Sakarina F1', Jupiter F1 - dvoubarevná - s barevně odlišným okem 3) pozdní (např. Alaska F1, 'Palazzo F1 - plnokvětá bez oka; b) stavbou květu: květ jednoduchý (např. Arizona F1, Herkules F1, Dakota F1, Jupiter F1) nebo poloplňný - plný: moderní skupina plnokvětých primulí, svým tvarem a velikostí připomínajících malý karafiát nebo růží (např. 'Palazzo F1, Solena F1, Girl's Delight F1, Bellarina F1), 3) barvou: jednobarevné bez oka, s okem (Jupiter F1, Lucia F1, Paradiso F1), s okrajovým lemem (Sakarina F1) - barevná škála zahrnuje snad všechny barvy (B, Ž, O, Č, M, F, LOS v různých odstínech a kombinacích)

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleníků \(Ano\)](#)

Ostatní

Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/26400096?tab=chromosomecounts>

Grafické přílohy



